

**CLASSES DE PREMIERES GÉNÉRALES
ET TECHNOLOGIQUES**

**OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES
Académie d'AIX-MARSEILLE
Session 2009**

Durée : 4 heures

Série S

Les calculatrices sont autorisées.

Ce sujet comporte 4 exercices indépendants.
Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche qu'il aura développée.
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Le sujet comporte **5 pages** dont celle-ci.

Exercice 1:


Partie A : Questions préliminaires

On considère trois entiers deux à deux distincts et compris entre 1 et 9.

- 1– Quelle est la plus petite valeur possible pour leur somme ?
- 2– Quelle la plus grande valeur possible pour leur somme ?

Partie B : Les triangles magiques

On place **tous les nombres entiers de 1 à 9** dans les neuf cases situées sur le pourtour d'un triangle, comme indiqué sur la figure ci-dessous.




Si les sommes des quatre nombres situés sur chacun des trois côtés du triangle ont la même valeur S , on dit que le triangle est S -magique.

(C'est à dire si : $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = n_4 + n_5 + n_6 + n_7 = n_7 + n_8 + n_9 + n_1 = S$)

On se propose de déterminer toutes les valeurs possibles de S .

- 1– Compléter le triangle suivant de sorte qu'il soit 20-magique, c'est-à-dire S -magique de somme $S = 20$.



- 2– On considère un triangle S -magique et on appelle T la somme des nombres placés sur les trois sommets.
 - a. Prouver qu'on a $45 + T = 3S$.
 - b. En déduire qu'on a $17 \leq S \leq 23$
 - c. Donner la liste des couples (S, T) ainsi envisageables.
- 3– Proposer un triangle 17-magique.
- 4– Prouver qu'il n'existe pas de triangle 18-magique.
- 5–
 - a. Montrer que dans un triangle 19-magique, 7 est nécessairement situé sur un sommet du triangle.
 - b. Proposer un triangle 19-magique.
- 6– Prouver que, s'il existe un triangle S -magique, alors il existe aussi un triangle $(40 - S)$ -magique.
- 7– Pour quelles valeurs de S existe-t-il au moins un triangle S -magique ?

Exercice 2:

On plie une feuille de papier rectangulaire le long d'une de ses diagonales ; on coupe les parties qui ne se recouvrent pas puis on déplie la feuille.

On admet qu'ainsi on obtient toujours un losange (cette propriété sera démontrée dans la dernière question de l'exercice).

L'unité de longueur choisie est le centimètre.

- 1– Construire le losange obtenu à partir d'une feuille rectangulaire de longueur $L = 16$ et de largeur $l = 8$.

On pourra noter c la longueur du côté du losange.

Les questions suivantes sont indépendantes.

- 2– Dans cette question, la feuille rectangulaire de départ a pour longueur 16 et pour largeur 8. Calculer la longueur du côté du losange.
- 3– On veut maintenant obtenir un losange de côté 7,5 à partir d'une feuille dont les dimensions (longueur et largeur) sont des nombres entiers. Quelles sont les dimensions possibles pour la feuille de départ ?
- 4– À partir d'une feuille de longueur L , on a obtenu un losange dont l'aire est égale à 75 % de celle de la feuille de départ. Exprimer, en fonction de L , la largeur l de la feuille de départ.
- 5– Démontrer le résultat admis initialement, à savoir que la manipulation décrite en début d'énoncé conduit toujours à un losange.

Exercice 3:

Une épreuve de mathématiques comporte quatre questions.

Pour chaque question, on obtient 0 point si la réponse est fautive ou 5 points si la réponse est bonne.

Une des questions consiste à trouver l'aire totale des six faces d'un cube dont le côté s'exprime par un nombre entier de mètres.

Une autre des questions est la suivante :

« Le prix d'une chemise, vendue avant les soldes à 20 €, baisse de 20 %. Quel est son nouveau prix ? »

Les réponses des élèves, sans unité, sont données par le tableau suivant :

| | Réponse à la première question | Réponse à la deuxième question | Réponse à la troisième question | Réponse à la quatrième question |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Alex | 16 | 18 | 16 | 10 |
| Carina | 12 | 24 | 12 | 14 |
| Jérôme | 12 | 24 | 16 | 18 |
| Lucille | 8 | 18 | 14 | 10 |
| Myriam | 16 | 26 | 16 | 14 |
| Nicole | 8 | 24 | 18 | 18 |
| Saïda | 8 | 20 | 16 | 10 |
| Yves | 16 | 24 | 18 | 10 |

Les notes 0 et 20 ont toutes deux été attribuées.


Quelles sont les notes de chacun des élèves ?

Justifier les réponses données.

Exercice 4:

Pour les besoins de son nouveau spectacle, le célèbre chanteur Johnny Rockstar souhaite créer une scène de spectacle moderne.

Cette scène est représentée vue de dessus par le schéma suivant :



Le demi-cercle C_1 de centre O passant par le point A et le demi-cercle C_2 de diamètre $[AB]$ sont tangents en A.

La droite (OD) est axe de symétrie de la figure et le point D appartient à C_1 .

Le demi-cercle C_3 est le symétrique de C_2 par rapport à (OD) .

Le point E est le point d'intersection du segment $[OD]$ et de C_2 .

Des contraintes de constructions imposent que $OA = 10$ m et $DE = 6$ m.

- 1- Calculer le rayon de C_2 .
- 2- C_4 est le cercle de centre I passant par le point D.
 C_4 est tangent à C_1 en D, tangent à C_2 en J, et tangent à C_3 en K.
Calculer le rayon de C_4 .

Propriété admise :

Si deux cercles de centre Ω et Ω' sont tangents en un point M, alors Ω , Ω' et M sont alignés.